

产品简介

T4 DNA Ligase 在ATP作为辅助的情况下，可以特异性催化双链DNA或者双链RNA的5'磷酸和3'羟基之间形成磷酸二酯键。本产品对与粘性末端和平末端的双链核酸片段均有较高的连接活性，同时，对于双链DNA，双链RNA或者DNA-RNA杂交链中的缺刻（Nick）也有修复作用。

但是本产品无法催化单链核酸之间的连接。

产品特点

酶活性高：酶比活性高，反应重复性好。

连接快速：10 min即可完成连接反应，省时省力。

适用性广：无论是粘性末端还是平末端，本产品均有较高的连接活性；无论是DNA连接还是RNA连接，本产品都有很好的适用性。

适用范围

1. 在二代测序（NGS）应用中，主要用于文库构建过程中的接头连接；
2. DNA片段与载体连接；
3. 其他需要进行双链核酸连接的实验。

产品来源

重组*E. coli*菌株,含有从T4噬菌体中克隆的连接酶基因。蛋白分子量大小约为：55.3 kDa。

活性单位

在1×DNA Ligase Buffer反应液中，在50 μl反应体系下，23°C、30 min内使100 ng粘性末端双链DNA片段连接50%时所需要的酶量定义为1个活性单位（U）。

使用示例

使用之前需要将T4 DNA Ligase (600 U/μl) 置于冰上备用；5×Rapid Ligation Buffer或10×Ligation Buffer解冻后，混匀，简短离心后置于冰上备用。

在NGS文库构建过程中

在NGS文库构建过程中，一般使用5×Rapid Ligation Buffer，按终浓度30~60 U/μl的量加入T4 DNA Ligase。也可根据实验具体情况来调整用量。

反应条件：20~25°C，15 min。

连接结束以后一般通过磁珠进行产物纯化。

在载体构建过程中

1. 按下表所示配制连接体系。

组分	体积 (μl)
5×Rapid Ligation Buffer或 10×Ligation Buffer	1×
载体DNA	1~10 ng/ μl
DNA片段	1~10 ng/ μl
T4 DNA Ligase (600 U/ μl)	0.5~1 μl
ddH ₂ O	补足至20 μl

注意：载体DNA和连接片段的摩尔比：对于不同的载体和DNA片段，要取得成功的连接，应分别建立具有不同摩尔数比例的连接反应。在大多数情况下，DNA片段的摩尔数应控制在载体DNA摩尔数的3~10倍。

2. 将上表中反应体系混匀，并简短离心，连接反应条件根据所选Buffer的不同而有所不同；如果选择5×Rapid Ligation Buffer，则反应条件为25°C，10 min；如果选用10×Ligation Buffer，则反应条件为16°C，10~12 h。
3. 取0.1~10 ng连接产物进行感受态细胞转化。



TIANGEN 官方微信，专业服务助力科研：

- 可视化操作指南
- 技术公开课合辑
- 全线产品查询
- 在线专家客服
- 微信直播课堂
- 最新优惠活动



Order: 010-59822688
Toll-free: 800-990-6057 /400-810-6057
TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD

版本号: NG181109

酶蛋白性质描述

性质	蛋白描述
蛋白纯度	>95%
酶活性	300,000 U/mg
核酸外切酶	6000 U酶中, <1.0%
核酸内切酶	6000 U酶中, 未检出
宿主基因组污染	6000 U酶中, <10拷贝

注意事项：请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

- 5×Rapid Ligation Buffer中含ATP，为避免ATP的降解，建议解冻后的5×Rapid Ligation Buffer分装成小包装并在-20℃保存。
- 平末端的载体与DNA片断连接时，应首先对载体进行去磷酸化，以防止载体自身环化。
- 5×Rapid Ligation Buffer中含有PEG，在后续感受态细胞转化过程中，PEG的存在会抑制电转感受态细胞的转化效果，为提高此操作的成功性，可按下面两种方法来进行：(1)通过核酸纯化试剂盒对连接产物纯化后再进行转化操作；(2)利用ddH₂O或者TE溶液对连接产物稀释10~100倍。稀释时需要注意的是要尽量保证用于转化的DNA连接产物量落在0.1~10 ng之间。

酶保存液成分

10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50%甘油, pH 7.5 @ 25℃。

TIANSeq T4 DNA Ligase (Rapid) T4 DNA连接酶 (快速)

目录号: NG201

产品内容

产品组成	NG201-01	NG201-02
T4 DNA Ligase (600 U/μl)	24,000 U	240,000 U
5×Rapid Ligation Buffer	500 μl	2×1 ml
10×Ligation Buffer	200 μl	2×1 ml

储存条件

-25℃~-15℃保存。保质期：一年。