

## 产品简介

本试剂盒采用加A法来进行miRNA第一链cDNA的反转录。具体过程是先通过*E. coli* Poly(A) Polymerase在miRNA 3'末端加多聚A尾Poly(A)，再使用Oligo(dT)-Universal Tag通用逆转录引物进行逆转录反应，最终生成miRNA对应的cDNA第一链。

miRcute Plus miRNA cDNA第一链合成试剂盒采用了双组分形式，简化了实验操作流程，降低了操作失误的可能性。本产品中的miRNA RT Enzyme Mix包含了*E. coli* Poly(A) Polymerase、RTase和RNasin。其中的*E. coli* Poly(A) Polymerase不但具有高效的加A尾效率，还可特异性识别单链miRNA，从而避免了具有双链结构的miRNA前体的进一步逆转录反应；RTase经过分子改造，去掉了RNase H活性，增加了RNA模板亲和力，从而使得miRNA的逆转录反应具有更高的效率和灵敏度。

本产品中的2×miRNA RT Reaction Buffer包含了miRNA加A尾反应和逆转录反应的所有原料和引物，并经过精心优化，可保证miRNA 3'末端的Poly(A)修饰过程和逆转录过程同时高效进行。

**注：本试剂盒须与miRcute Plus miRNA荧光定量检测试剂盒(FP411)配套使用**

## 产品特点

- 省时省力。**本试剂盒将miRNA的加A尾反应和逆转录反应合二为一，在减少操作步骤的同时也节省了一半的反应时间。另外，本试剂盒为双组分形式，操作过程中只需加入RNA模板和两个组分即可进行miRNA的逆转录反应，进一步简化了操作。
- 特异性强。**本试剂盒中的*E. coli* Poly(A) Polymerase和RTase都只针对单链的miRNA进行修饰和逆转录反应，可避免具有二级结构的miRNA前体进行逆转录反应。
- 灵敏度高。**本试剂盒通过将加A尾反应和逆转录反应的整合实现了miRNA的加A产物可全部进行进一步的逆转录反应，大大提高了低丰度miRNA的检出率。
- 适用广泛。**本试剂盒可针对几乎所有材料提取的miRNA进行逆转录反应，模板的使用范围可达20 pg~2 µg(质量范围)和10 fM~100 pM(浓度范围)。

## 操作步骤

### 一、反转录体系的配制

解冻2×miRNA RT Reaction Buffer并混匀，miRNA RT Enzyme Mix放于冰中备用，在冰上预冷RNase Free的反应管内加入以下试剂至总体积20 µl(最后加入 miRNA RT Enzyme Mix)。

试剂组分	体积	终浓度
Total RNA*	-	可达2 µg
2×miRNA RT Reaction Buffer	10 µl	1×
miRNA RT Enzyme Mix	2 µl	-
RNase-Free ddH <sub>2</sub> O	补至20 µl	-

\*反应中所使用的Total RNA必须含有小分子RNA。此过程也可以使用小分子RNA作为模板，建议加入量为2-5 µl。可根据目的miRNA丰度决定加入量，但是对于低丰度miRNA样品而言(如血清血浆提取物)，可直接加入最大体积8 µl。

### 二、反转录程序

移液器轻轻混匀上述配制的反应液，按下表程序进行miRNA的逆转录反应：

反应温度	反应时间	说明
42°C	60 min	miRNA加A尾反应和逆转录反应
95°C	3 min	酶失活反应

合成的cDNA反应液可放置于-20°C保存；也可以直接进行下游荧光定量检测。在进行下游荧光定量检测时，为避免逆转录体系对定量PCR反应的抑制，得到合适的Ct值(15-30之间)，可将cDNA反应液稀释10-1000倍后使用。



TIANGEN官方微信，专业服务助力科研：

- 可视化操作指南
- 技术公开课合辑
- 全线产品查询
- 在线专家客服
- 微信直播课堂
- 最新优惠活动



Order: 010-59822688  
Toll-free: 800-990-6057 / 400-810-6057  
TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD

版本号: KR201101X

## 注意事项

预防RNase污染，应注意以下几方面：

1. 经常更换新手套。因为皮肤经常带有细菌，可能导致RNase污染。
2. 使用无RNase的塑料制品和枪头避免交叉污染。
3. RNA在裂解液中不会被RNase降解。但提取后继续处理过程中应使用不含RNase的塑料和玻璃器皿。玻璃器皿可在150℃烘烤4 h，塑料器皿可在0.5 M NaOH中浸泡10 min，然后用水彻底清洗，再灭菌，即可去除RNase。
4. 配制溶液应使用无RNase的水(将水加入到干净的玻璃瓶中，加入DEPC至终浓度0.1% (v/v)，放置过夜，高压灭菌)。

# miRcute Plus miRNA First-Strand cDNA Kit

## miRcute增强型miRNA cDNA第一链合成试剂盒

目录号: KR211

## 产品内容

产品组成	KR211-01 (20 µl × 25 rxn)	KR211-02 (20 µl × 50 rxn)
miRNA 反转录混合酶 miRNA RT Enzyme Mix	50 µl	100 µl
2×miRNA反转录缓冲液 2×miRNA RT Reaction Buffer	250 µl	500 µl
无RNA酶双蒸水 RNase-Free ddH <sub>2</sub> O	1 ml	1 ml

## 运输条件

干冰运输。

## 储存条件

收到本产品后，请立即置于-20℃下保存。从-20℃取出使用时，将miRNA RT Enzyme Mix需放在冰中备用；将冻存的2× miRNA RT Reaction Buffer融解，融解后轻轻颠倒混匀，待溶液完全均一后再行使用。

本产品于-20℃下可保存1年。