

TIANSeq Klenow (3'-5'exo-) (Low Conc.) Klenow片段(3'-5' exo-)(低浓度)

目 录 号: **NG215**

储存条件: **-30~-15℃**保存, 保质期为一年

浓 度: **5 U/μl**

产品内容:

产品组成	NG215-01	NG215-02
Klenow(3'-5'exo-) (Low Conc.)	2500 U	2×5000U
10×Blue Buffer	1.5 ml	2×1.5ml

Order: 010-59822688
Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057
TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

Klenow (3'-5'exo-) (低浓度) 是DNA Klenow Fragment的突变酶。该酶在模板和引物存在的条件下, 以dNTP作底物, 沿5'-3'方向催化与模板互补DNA的合成。通过点突变改造, 使本酶同时失去了3'-5'外切核酸酶的活性和切刻平移活性。本产品是通过大肠杆菌表达的重组酶。分子量大小约为68.1 kDa。

单位定义

1单位活力定义为在37℃、30分钟内, 将10 nmol dNTP掺入到酸不溶物质中所需的酶量。

酶保存液成分

20 mM Tris-HCl, 0.1 mM EDTA,1 mM DTT, 50%甘油,pH 7.5 @ 25℃.

产品特点

1. 通过点突变改造使得本酶的5'-3'聚合酶活性更强。
2. 酶比活性高, 稳定性好, 与其他酶兼容能力强。

酶蛋白性质描述

性质	蛋白描述
蛋白纯度	>99%
酶活性	10,000 U/mg
单链外切酶活性	500 U酶中, <10.0%
双链外切酶活性	500 U酶中, <10.0%
双链内切酶活性	500 U酶中, 未检出
宿主基因组污染	500 U酶中, <10个拷贝
UDG酶活性	<20 U/ml

应用范围

1. 在二代测序（NGS）应用中, 主要用于文库构建过程中平端双链DNA片段的加“A”反应。
2. 双脱氧法DNA序列测定（Sanger 法）。

使用方法

在NGS文库构建过程中, 一般按终浓度0.1 U/μl的量加入Klenow (3'-5' exo-) (低浓度)。也可根据实验具体情况来调整用量。

反应条件: 37℃, 30 min。

反应结束以后, 后续一般会进行产物纯化操作。